



آموزش به بیمار آمادگی جهت ام ار آی (MRI)



واحد آموزش سلامت
بیمارستان
خاتم الانبیاء شیروان
خرداد ۱۴۰۳

در زمان ناشتایی ، مصرف داروهای ضروری با مقدار کمی آب ، مانعی ندارد.

مصرف یک لیوان آب آناناس ۱۵ دقیقه قبل از انجام کار جهت بهتر دیده شدن مجرای صفراوی الزامی است (در افراد دیابتی با مشورت پزشک مصرف شود).

آمادگی جهت ام ار آی با تزریق

هر نوع حساسیت غذایی و یا دارویی ، حتما اطلاع داده شود.

در موارد با تزریق ، بیمار بایستی ۴ ساعت قبل از انجام MRI ، ناشتا باشد.

بیماران بستری در بیمارستان ، با رگ باز (آنژیوکت) مراجعه نمایند.

هر نوع حساسیت غذایی و یا تزریق دارویی قبل از انجام عکس با تزریق حتما اطلاع داده شود

در موارد MRI شکم و لگن با تزریق و دینامیک کبد از ۲۴ ساعت قبل ، از مصرف قرص آهن و غذای چرب و سنگین خودداری نمایید.

آمادگی جهت ام ار آی (MRI)

۱- در صورت داشتن قطعات فلزی در بدن مثل باطری قلب ، پیس میکر (ضربان ساز قلب) دریچه مصنوعی قلب ، سمعک و کاشت حلزونی گوش ، پلیسه های فلزی در چشم و کلیپس مغزی و شنت مغز ، ترکش در بدن و یا پلاتین در اندام ها ، حتما و قبل از انجام کار همکاران رادیولوژی و پرستار و یا پزشک خود را در جریان بگذارید.

۲- در صورتی که در زمان های قرار گیری در مکان های تنگ و باریک دچار هراس و اضطراب می شوید پرستار و همکار رادیولوژی را در جریان بگذارید.

۳- به همراه داشتن هر قطعه فلزی (جوهرات ، زینت آلات ، ساعت ، کارت اعتباری ، موبایل و هر شیء فلزی دیگر) موجب اختلال در تصاویر و از کار افتادن آن وسیله می شود.

آمادگی لازم جهت انجام ام آر ای مجاری صفراوی (MRCP)

۶ الی ۸ ساعت قبل از تصویر برداری ، از خوردن جامدات و از ۴ ساعت قبل از آن از نوشیدن مایعات (آشامیدن آب ، جویدن آدامس و استعمال دخانیات) خودداری فرمایید.

از ۱۲ تا ۲۴ ساعت قبل از انجام کار از مصرف تخم مرغ ، شیرینی و غذای چرب خودداری شود تا کیسه صفرا منقبض و خالی نشود.