



آموزش به بیمار

آمادگی جهت سی تی اسکن



واحد آموزش سلامت
بیمارستان
خاتم الانبیاء شیروان
زمستان ۱۴۰۳

- داروی تزریقی از طریق آنژیوکت نصب شده در ورید دست تزریق می شود.

- در سی تی اسکن با تزریق ناشتایی، ۲ تا ۳ ساعت قبل از انجام سی تی اسکن کافی است.

- برای دفع ماده حاجب، تا دو روز پس از انجام سی تی اسکن، حتماً روزی ۵ تا ۶ لیوان آب بنوشید.

- مادران شیرده باید تا ۲۴ ساعت پس از تزریق ماده کنتراست به فرزند خود شیر ندهند.

- زنان در صورت احتمال بارداری قبل از انجام سی تی اسکن حتماً باید پزشک یا کارشناس مربوطه را باخبر سازند.

آمادگی جهت سی تی اسکن

- هر نوع حساسیت، سابقه آسم و دیابت، بیماری های کلیوی و تیروئیدی، بیماری مسری، هیپاتیت، سل، ایدز و ... راحتماً به پزشک، پرستار یا همکاران رادیولوژی اطلاع دهید.

- سی تی اسکن هایی که بدون کنتراست انجام می گردد، نیاز به آمادگی قبلی نمی باشد و فقط باید هیچ فلزی در ناحیه عضو مورد نظر نباشد و اگر سی تی اسکن شکم و لگن بدون تزریق می باشد در یک هفته تا ده روز اخیر، بیمار سابقه رادیوگرافی هایی مانند ترانزیت، باریم انماء نداشته باشد.

- جهت انجام سی تی اسکن با تزریق، آزمایش (BNN/Cratinine) بیمار الزامی است.

- داروهای خود را طبق برنامه همیشگی تان استفاده کنید، البته به جز متفورمین (قطع این دارو از ۴۸ ساعت قبل از انجام آزمون الزامی است و مصرف دوباره قرص متفورمین به شرط عملکرد طبیعی کلیه ها پس از انجام آزمون با تزریق ماده حاجب بلامانع است).

- در صورت انجام سی تی اسکن با ماده حاجب خوراکی، یک تا دو ساعت قبل از انجام، باید خوردن ماده حاجب خوراکی را شروع کنید. معمولاً ماده حاجب خوراکی را در داخل یک بطری آب معدنی یک و نیم لیتری حل می کنند و شما هر ۱۵ دقیقه یکبار، یک لیوان را باید میل نمایید. به صورتی که لیوان آخر دقیقاً قبل از انجام آزمون نوشیده شود.