



آموزش به بیمار

گرافی (عکس)



واحد آموزش سلامت  
بیمارستان  
خاتم الانبیاء شیروان  
زمستان ۱۴۰۳

۶-لباس بیمار ساده و بدون پوشش های فلزی باشد.

۷-بیمارانی که گرافی کلیه ( IVP ) دارند همراه داشتن جواب آزمایش اوره و کراتینین الزامی می باشد.

۸- بیمارانی که گرافی کلیه ( IVP ) در صورت دیابت مصرف متفورمین ۴۸ ساعت قبل و بعد از تزریق قطع شود.

### آمادگی لازم جهت گرافی مری و معده و ترانزیت

۱-بیمار حداقل ۸ ساعت قبل از انجام گرافی ناشتا باشد.

۲-روز انجام گرافی داروهای معده میل نشود

۳-از چند ساعت قبل از انجام گرافی استعمال سیگار ممنوع است

۴-جهت انجام گرافی مری یک بسته ،گرافی مری و معده و اثنی عشر ( UGI ) دو بسته و ترانزیت سه بسته پودر سولفات باریم نیاز است

۵-زمان تقریبی رادیوگرافی ترانزیت ۴ تا ۶ ساعت می باشد

&اقداماتی که در بخش رادیولوژی نیاز به آمادگی دارند.

&

گرافی (عکس) از شکم ،مهره های کمری و کلیه ها ( IVP ):

۱-از یک روز قبل از انجام گرافی از خوردن مواد غذایی نفاخ (نخود-لوبیا-عدس-شیر-نوشیدنی های گازدار ) خودداری نمایید.

۲-ساعت ۷ شب یک شام ساده میل نمایید (مثلا سوپ صاف شده )

۳-بعد از شام یک شیشه روغن کرچک ۴۰ گرمی کامل کامل میل کنید(برای اطفال نصف این مقدار استفاده شود)

۴-ساعت ۸ شب ۴ عدد قرص دایمیتیکون به فاصله یک ساعت از هم جویده و میل نمایید.

۵-بعد از مصرف داروهای فوق اگر محدودیت حرکتی ندارید کمی فعالیت بدنی داشته باشید و مایعات فراوان ترجیحا گرم بنوشید( از خوردن غذا تا اتمام انجام گرافی خودداری نمایید

### آمادگی لازم جهت انجام گرافی باریم انما

۱-از یک روز قبل از انجام گرافی از خوردن مواد غذایی نفاخ (نخود-لوبیا-عدس-شیر-نوشیدنی های گازدار ) خودداری نمایید.

۲-ساعت ۷ شب یک شام ساده میل نمایید (مثلا سوپ صاف شده )

۳-بعد از شام یک شیشه روغن کرچک ۴۰ گرمی کامل میل کنید(برای اطفال نصف این مقدار استفاده شود)

۴-ساعت ۸ شب ۴ عدد قرص دایمیتیکون به فاصله یک ساعت از هم جویده و میل نمایید.

۵-بعد از مصرف داروهای فوق اگر محدودیت حرکتی ندارید کمی فعالیت بدنی داشته باشید و مایعات فراوان ترجیحا گرم بنوشید( از خوردن غذا تا اتمام انجام گرافی خودداری نمایید.

۶-صبح ۲ ساعت قبل از مراجعه به بخش رادیولوژی یک عدد شیاف بیزاکودیل استعمال نمایید.

۷-لباس بیمار ساده و بدون پوشش های فلزی باشد.

۸-سه بسته پودر سولفات باریم و یک عدد رکتال تیوپ شماره ۲۵ مورد نیاز می باشد.