



آموزش به بیمار

همه آنچه باید درباره داروهای مسکن و تب بر بدانیم



واحد آموزش سلامت بیمارستان خاتم الانبیاء
شیروان
زمستان ۱۴۰۳

منابع: راهنمای آموزش مددجو برای مراقبت در منزل/
مترحم: فاطمه علایی/ تألیف: دانا مایرز

آسپرین (آ اس آ) نباید به افراد زیر ۲۰ سال که بیماری ویروسی دارند تجویز شود زیرا میتواند بیماری کبدی به نام سندرم رای ایجاد کند. بروفن خطر ایجاد سندرم رای ندارد. از این دارو میتوان به تنهایی یا در کنار استامینوفن برای تب و درد در بیمارانی که به خوبی به استامینوفن پاسخ نمیدهند، استفاده کرد. بروفن میتواند ناراحتی را به مدت طولانیتری رفع کند (۶ تا ۸ ساعت در مقابل ۴ تا ۶ ساعت با استامینوفن). بروفن را در بسته‌بندیهای ویژه کودکان نیز میفروشند. در کودکان برای تب و درد، استامینوفن انتخاب اول است

همه آنچه باید درباره داروهای مسکن و تب بر بدانیم

اکثر مردم با آسپرین و تایلنول آشنا هستند. این ها نام تجاری داروی رایج آ اس آ (اسید استیل سالیسیلیک) و استامینوفن هستند. این داروها برای درمان درد و تب به کار می روند. آسآ خاصیت ضد التهابی (تورم، گرما، قرمزی) دارد ولی خاصیت ضد التهابی استامینوفن اندک است.

یکی از داروهای جدید که میتوان بدون نسخه از داروخانه خرید بروفن است. این دارو به همان دسته دارویی متعلق است که آ اسآ تعلق دارد. این دسته دارویی داروهای ضدالتهابی غیراستروئیدی خوانده میشود. این داروها میتوانند درد را رفع کنند، تب را کم کنند و نیز التهاب را کاهش دهند. ممکن است فکر کنید این داروها بهترین هستند چراکه هم درد و هم التهاب را رفع میکنند متأسفانه این داروها میتوانند در بعضی بیماران زخم معده، مشکلات کلیوی و کاهش گذرای پلاکت ایجاد کنند. برای کاهش عوارض گوارش بهتر است این داروها پس از غذا خورده شوند.

شما ممکن است شنیده باشید بعضی میگویند که یکی از این داروها بهتر از داروهای دیگر روی درد تأثیر دارد. هر چند ممکن است این تفاوت در افراد مختلف وجود داشته باشد ولی اغلب علت عدم کنترل درد، استفاده از دوز نامناسب این داروهاست. این امر به خصوص در درمان کودکان اهمیت دارد. دستور دارویی روی جعبه معمولاً دوز مناسب را برای سن درج کرده است. در مورد دوز مناسب و نحوه مصرف دارو با دکتر داروساز مشورت کنید.

ترکیبات مسکن متعددی وجود دارند که کافنین را در ترکیب با آس آ عرضه میکنند. این ترکیب به اثربخشی بیشتر آس آ کمک میکند ولی در اکثر مواقع مورد نیاز نیست.

محتوای کافنین این ترکیبات معادل کافنین نیم فنجان قهوه است.

گاهی برای بهبود اثر تسکین درد، داروی مخدری به آس آ یا استامینوفن اضافه میشود که معمولاً کدئین است

به یاد داشته باشید هنگامی که از دارو برای رفع درد یا کنترل تب استفاده میکنید، بیشترین موفقیت زمانی به دست می آید که دارو را در فواصل زمانی منظم مصرف کنید. اگر صبر کنید تا درد واقعاً زیاد شود یا تب خیلی بالا رود مدت زمان بیشتری طول می کشد تا علایم تحت کنترل درآیند. در کودکان و نوزادان تب میتواند علامت یک بیماری جدی باشد بنابراین حتماً به پزشک متخصص مراجعه کنید و از دادن آسپرین خودداری نمایید